

## 胃がん

【S-1+ドセタキセル療法】

【DS術後補助療法】

【ニボルマブ単独療法】

【S-1単独療法】

【Weekly パクリタキセル単独療法】

【Weekly パクリタキセル+ラムシルマブ療法】

【Weekly アルブミン懸濁型パクリタキセル単独療法】

【Weekly アルブミン懸濁型パクリタキセル+ラムシルマブ療法】

【Tri-Weeklyアルブミン懸濁型パクリタキセル単独療法】

【S-1+オキサリプラチン療法】

【SOX療法】

【S-1+オキサリプラチン+トラスツズマブ療法】

【SOX+トラスツズマブ療法】

【カペシタビン+シスプラチン療法】

【XP療法】

【カペシタビン+シスプラチン+トラスツズマブ療法】

【XP+トラスツズマブ療法】

【カペシタビン+オキサリプラチン療法】

【CAPOX療法】

【イリノテカンA法療法】

【CPT(A)療法】

【イリノテカンB法療法】

【CPT(B)療法】

【フルオロウラシル+レボホリナート+オキサリプラチン療法】

【mFOLFOX6療法】

【S-1+シスプラチン療法】

【SP療法】

【S-1+シスプラチン+トラスツズマブ療法】

【SP+トラスツズマブ療法】

【S-1+オキサリプラチン+ニボルマブ療法】

【SOX+Nivo療法】

【ラムシルマブ単独療法】

【フルオロウラシル+レボホリナート+オキサリプラチン+ニボルマブ療法】

【mFOLFOX6+Nivo療法】

【トラスツズマブ デルクステカン単独療法】

【カペシタビン+オキサリプラチン+トラスツズマブ療法】

【CAPOX+トラスツズマブ療法】

【カペシタビン+オキサリプラチン+ゾルベツキシマブ療法】

















## 【S-1+オキサリプラチン療法】

### 【SOX療法】

適応疾患: 切除不能進行・再発胃がん

投与スケジュール: 1クール21日

使用抗がん剤と治療のスケジュール（●は投与日）（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
※S-1	80mg/m <sup>2</sup> /day		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
オキサリプラチン	100mg/m <sup>2</sup>	120分	●																					

※ S-1 14日間の投与であるが点滴当日帰宅後夕刻からの投与であれば15日目朝までの内服となる。

## 【S-1+オキサリプラチン+トラスツズマブ療法】

### 【SOX+トラスツズマブ療法】

適応疾患: 切除不能進行・再発胃がん

投与スケジュール: 1クール21日

使用抗がん剤と治療のスケジュール（●は投与日）（副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
※トラスツズマブ	8mg/kg	90分	●																				
オキサリプラチン	100mg/m <sup>2</sup>	120分	●																				
※S-1	80mg/m <sup>2</sup> /day		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

※ トラスツズマブ維持投与量6mg/kg 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可。

※ S-1 14日間の投与であるが点滴当日帰宅後夕刻からの投与であれば15日目朝までの内服となる。

## 【カペシタビン+シスプラチン療法】

### 【XP療法】

適応疾患: 切除不能進行・再発胃がん

投与スケジュール: 1クール21日

使用抗がん剤と治療のスケジュール（●は投与日）（副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	120分	●																				
※カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

※ カペシタビン 14日間の投与であるが点滴当日帰宅後夕刻からの投与であれば15日目朝までの内服となる。

## 【カペシタビン＋シスプラチン＋トラスツズマブ療法】

### 【XP＋トラスツズマブ療法】

適応疾患：切除不能進行・再発胃がん

投与スケジュール：1クール21日

使用抗がん剤と治療のスケジュール（●は投与日）（副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
※トラスツズマブ	8mg/kg	90分	●																				
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	120分	●																				
※カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

※ トラスツズマブ維持投与量6mg/kg 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可。

※ カペシタビン 14日間の投与であるが点滴当日帰宅後夕刻からの投与であれば15日目朝までの内服となる。

## 【カペシタビン+オキサリプラチン療法】

### 【CAPOX療法】

適応疾患: 切除不能進行・再発胃がん

投与スケジュール: 1クール21日

使用抗がん剤と治療のスケジュール（●は投与日）（副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	120分	●																				
※カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

※ カペシタビン 14日間の投与であるが点滴当日帰宅後夕刻からの投与であれば15日目朝までの内服となる。



## 【イリノテカンB法療法】

### 【CPT(B)療法】

適応疾患: 切除不能進行・再発胃がん

投与スケジュール: 1クール35日

使用抗がん剤と治療のスケジュール (●は投与日) (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	90分	●														●													

29	30	31	32	33	34	35



# 【S-1+シスプラチン療法】

## 【SP療法】

適応疾患: 切除不能進行・再発胃がん

投与スケジュール: 1クール35日

使用抗がん剤と治療のスケジュール (●は投与日) (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	120分								●																				
S-1	80mg/m <sup>2</sup> /day		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

29	30	31	32	33	34	35

## 【S-1+シスプラチン+トラスツズマブ療法】

### 【SP+トラスツズマブ療法】

適応疾患: 切除不能進行・再発胃がん

投与スケジュール: 1クール21日

使用抗がん剤と治療のスケジュール (●は投与日) (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
※トラスツズマブ	8mg/kg	90分	●																				
シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	120分	●																				
※S-1	80mg/m <sup>2</sup> /day		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

※ トラスツズマブ維持投与量6mg/kg 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可。

※ S-1 14日間の投与であるが点滴当日帰宅後夕刻からの投与であれば15日目朝までの内服となる。

## 【S-1+オキサリプラチン+ニボルマブ療法】

### 【SOX+Nivo療法】

適応疾患: 切除不能進行・再発胃がん

投与スケジュール: 1クール21日

使用抗がん剤と治療のスケジュール（●は投与日）（副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ニボルマブ	360mg/body	30分	●																				
オキサリプラチン	100mg/m <sup>2</sup>	120分	●																				
※S-1	80mg/m <sup>2</sup> /day		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

※ S-1 14日間の投与であるが点滴当日帰宅後夕刻からの投与であれば15日目朝までの内服となる。





## 【トラスツズマブ デルクステカン単独療法】

適応疾患: 切除不能進行・再発胃がん

投与スケジュール: 1クール21日

使用抗がん剤と治療のスケジュール (●は投与日) (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	90分	●																				

※ トラスツズマブ デルクステカン初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は30分間で投与可。

## 【カペシタビン+オキサリプラチン+トラスツズマブ療法】

### 【CAPOX+トラスツズマブ療法】

適応疾患: 切除不能進行・再発胃がん

投与スケジュール: 1クール21日

使用抗がん剤と治療のスケジュール (●は投与日) (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
※トラスツズマブ	8mg/kg	90分	●																				
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	120分	●																				
※カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

※ トラスツズマブ維持投与量6mg/kg 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可。

※ カペシタビン 14日間の投与であるが点滴当日帰宅後夕刻からの投与であれば15日目朝までの内服となる。

## 【カペシタビン+オキサリプラチン+ゾルベツキシマブ療法】

適応疾患: 切除不能進行・再発胃がん

投与スケジュール: 1クール21日

使用抗がん剤と治療のスケジュール (●は投与日) (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ゾルベツキシマブ	★800mg/m <sup>2</sup>	120分 以上	●																					
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	120分	●																					
※カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

★ ゾルベツキシマブ 維持投与量は600mg/m<sup>2</sup>

※ カペシタビン 14日間の投与であるが点滴当日帰宅後夕刻からの投与であれば15日目朝までの内服となる。